CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Autarquia Federal - Lei n.º 5.905/1973

PARECER TÉCNICO COREN-DF n.º 17/2021

EMENTA: Realização de Raio X após sondagem nasoentérica em pacientes paliativos pelo Núcleo de Atenção Domiciliar (NRAD), dada a dificuldade de locomoção de tais pacientes para o exame.

Descritores: sondagem nasoentérica, enfermagem, atenção domiciliar.

1. DO FATO

Em 01/02/2021, o Coren-DF realizou reunião com membros da equipe de responsáveis pelo Núcleo Regional de Atenção Domiciliar de Ceilândia – NRAD/Ceilândia/DF, cuja pauta foi a solicitação de apoio/diretrizes/parecer do COREN-DF direcionado para a Assistência Domiciliar em Cuidados Paliativos no que tange ao uso de Morfina em dose contínua, administrado via bomba de infusão, sendo atendida a solicitação por meio do Parecer 12/2021, já publicado.

No decorrer da citada reunião, as responsáveis pelo NRAD/Ceilândia /DF também solicitaram parecer sobre a necessidade de RX após a realização de sondagem nasoentérica em pacientes paliativos, dada a dificuldade de locomoção de tais pacientes para a realização do procedimento.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE

A Enfermagem, de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, segundo a Resolução Cofen nº 564/2017, está definida como:

[...] uma ciência, arte e uma prática social, indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde; tem como responsabilidades a promoção e a restauração da saúde, a prevenção de agravos e doenças e o alívio do sofrimento; proporciona cuidados à pessoa, à família e à coletividade; organiza suas ações e intervenções de modo autônomo, ou em colaboração com outros profissionais da área; [...] (BRASIL, 2017).

A profissão de Enfermagem está regulamentada na Lei 7.498, de 25 de junho de 1986 e no Decreto 94.406, de 8 de junho de 1987. Definem-se nestes documentos os direitos, as competências das diferentes categorias da Enfermagem, além das penalidades a serem impostas aos infratores dos preceitos éticos (BRASIL, 1986, 1987, 2018).

O presente parecer técnico baseia-se em conceitos e normatizações relacionadas aos serviços de Atenção Domiciliar, Terapia Nutricional Enteral (TNE) e Responsabilidades da Enfermagem, especialmente no que se refere às recomendações nacionais e internacionais para monitoramento de acessos enterais. Por oportuno, também serão abordados pareceres já emitidos por este Conselho Regional de Enfermagem, bem como pelo COFEN, sobre a temática.

2.1. Sobre os serviços de Atenção Domiciliar

O regulamento técnico e requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de Atenção Domiciliar estão normatizados pela RDC nº 11, de 26 de janeiro de 2006. No que tange ao conceito de atenção domiciliar, a RDC o define como um “*termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio*”. Neste sentido, tais serviços devem “*assegurar o suporte técnico e a capacitação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente*”, assim como “*prover, por meio de recursos próprios ou terceirizados, profissionais, equipamentos, materiais e medicamentos de acordo com a modalidade de atenção prestada e o perfil clínico do paciente*” (BRASIL, 2006).

Ressalta-se que, de acordo com a RDC nº 11, os serviços de atenção domiciliar, devem assegurar *suportes diagnósticos e terapêuticos* como exames laboratoriais e radiológicos, exames por métodos gráficos, hemoterapia, quimioterapia, diálise e Nutrição Parenteral e, *serviços básicos de retaguarda* de acordo com a necessidade de cada paciente, como atendimento de urgência e emergência, internação hospitalar, referência ambulatorial para avaliações especializadas, realização de procedimentos específicos e acompanhamento pós alta.

2.2. Terapia Nutricional Enteral (TNE), Enfermagem e Confirmação do

posicionamento de sondas enterais

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 503, de 27 de maio de 2021, define Terapia Nutricional Enteral (TNE) como um procedimento que auxilia a manter o estado nutricional comprometido, através de dietas enterais, que consistem em fórmulas alimentares que substitui parcial ou total a alimentação oral (BRASIL, 2021). Para implementação da TNE *é necessária uma sonda enteral, a qual pode ser inserida por meio das regiões nasal, oral ou um orifício na região abdominal, cuja posição distal pode ser a nível gástrico ou pós-pilórico (entérico)*. As denominações da sondagem em nasoentérica, nasogástrica, orogástrica, oroentérica, gastrostomia e jejunostomia estão relacionadas ao seu local de inserção, cuja escolha decorre da avaliação das condições clínicas do paciente, tempo de permanência, necessidades nutricionais e riscos de complicações (SILVA, PINTO, ROCHA, 2020).

A RDC nº 503 de 27 de maio de 2021, Capítulo VI, referente às boas práticas de administração da nutrição enteral, preconiza como responsabilidades dos profissionais de enfermagem na TNE:

“Art. 235. A equipe de enfermagem envolvida na administração da NE é formada pelo enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, tendo cada profissional suas atribuições dispostas em legislação específica.

Art. 236. O enfermeiro é o coordenador da equipe de enfermagem, cabendo-lhe as ações de planejamento, organização, coordenação, execução, avaliação de serviços de enfermagem, treinamento de pessoal e prescrição de cuidados de enfermagem ao paciente.

Art. 237. O enfermeiro deve participar do processo de seleção, padronização, licitação e aquisição de equipamentos e materiais utilizados na administração da NE e controle do paciente.

Art. 238. O enfermeiro é responsável pela administração da NE e prescrição dos cuidados de enfermagem em nível hospitalar, ambulatorial e domiciliar”.

Nos artigos que tratam do preparo do paciente e acesso enteral, assim a RDC 503 determina:

“Art. 256. No procedimento de preparo do paciente e acesso enteral, é necessário orientar o paciente e sua família quanto à:

I - terapia, seus objetivos e riscos, ressaltando a importância da participação dos mesmos durante todo o processo; e

II - via de administração da NE, técnica de inserção da sonda e as possíveis intercorrências que possam advir, enfatizando que a comunica-

ção destas imediatamente à equipe de enfermagem, possibilita que as providências sejam tomadas em tempo hábil.

Art. 257. A equipe de enfermagem deve facilitar o intercâmbio entre os pacientes submetidos à TNE e suas famílias, visando minimizar receios e apreensões quanto à terapia implementada.

Art. 258. O enfermeiro deve participar da escolha da via de administração da NE em consonância com o médico responsável pelo atendimento ao paciente e a EMTN (equipe multiprofissional de terapia nutricional).

Art. 259. É responsabilidade do enfermeiro estabelecer o acesso enteral, por via oro/nasogástrica ou transpilórica, para administração da NE, conforme procedimento pré-estabelecido.

Art. 260. **É responsabilidade do enfermeiro encaminhar o paciente para exame radiológico, visando a confirmação da localização da sonda (grifo nosso)**”.

A Sociedade Americana de Nutrição Parenteral (*ASPEN-Safe Practices for Enteral Nutrition Therapy*), em documento publicado em 2017, aponta que há um consenso geral entre as diretrizes internacionais de que uma radiografia adequadamente obtida e interpretada é o método mais preciso para se confirmar o correto posicionamento de sondas enterais, devido seu alto grau de precisão, sendo considerado método de primeira linha (BOULLATA et. al, 2017). Além da confirmação radiográfica, a ASPEN também recomenda a obtenção de aspirado gástrico para avaliação da aparência e medição de pH, dado que ambos variam conforme a localização da sonda, porém este método apresenta maior grau de imprecisão do que o radiográfico.

2.3. Acessos Enterais por meio de sondas nasogástricas e nasoentéricas

O uso das sondas enterais é um procedimento rotineiro na prática clínica das unidades que atendem pacientes críticos, e por extensão, daqueles que necessitam de cuidados domiciliares, sendo geral e frequentemente realizada pelos (as) enfermeiros (as). As complicações graves relacionadas à manobra decorrem da possibilidade de danos à árvore traqueobrônquica, pneumotórax, pneumomediastino, enfisema subcutâneo, pneumonia, hemorragia pulmonar, empiema, hemotórax, fístula broncopleural, perfuração do esôfago ou mesmo morte.

Por meio da Resolução N° 619/2019, que normatiza a atuação da Equipe de Enfermagem na Sondagem Oro/nasogástrica e Nasoentérica, o COFEN entende que o termo

sondagem oro/nasoenteral, abrange tanto a sondagem oro/nasogástrica como a nasoentérica, sendo de qualquer modo um procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente, cuja instalação exige técnica uniformizada, para reduzir ou abolir consequências decorrentes do procedimento. Neste sentido, define como competências do Enfermeiro na sondagem oro/nasoenteral:

- a) Definir o calibre da sonda que será utilizada, de acordo com o procedimento prescrito;
- b) Estabelecer o acesso enteral por via oro/nasogástrica ou transpilórica para a finalidade estabelecida (alimentar, medicar, lavar, drenar líquidos ou ar, coletar material gástrico e realizar exames para fins diagnósticos);
- c) Proceder os testes para confirmação do trajeto da sonda;
- d) Solicitar e encaminhar o paciente para exame radiológico visando a confirmação da localização da sonda, no caso da sondagem nasoentérica;
- e) Garantir que a via de acesso seja mantida;
- f) Garantir que a troca das sondas e equipo seja realizada em consonância com o pré-estabelecido pela CCIH da instituição;
- g) Prescrever os cuidados de enfermagem;
- h) Registrar em prontuário todas as ocorrências e dados referentes ao procedimento;
- i) Participar do processo de seleção do material para aquisição pela instituição;
- j) Manter-se atualizado e promover treinamento para os técnicos de enfermagem, observada a sua competência legal.”

Embora estudos apontem taxas de colocação incorreta em torno de 0,5 a 1,5%, o que aparentemente se apresenta como baixo percentual, é difícil estimar a frequência exata desse evento (ZATELLI, VEZZALI, 2016). Brandt (2010), em estudo que analisou a técnica da ausculta para confirmação da colocação de sondas entéricas, identificou erros em torno de 20% na realização da ausculta pelos profissionais, concluindo que a melhor forma de certificar-se da localização da sonda é por meio do Raio-X e de outras medidas como pH e determinação de bilirrubina na secreção aspirada.

O Parecer Técnico 09/2011 do Coren-DF, buscou responder ao questionamento “*se o enfermeiro que presta assistência ao paciente crônico no domicílio, pode passar sonda nasogástrica ou nasoenteral e administrar alimentação ou medicamentos por esta via, sem realizar o raio X, para certificação do posicionamento da referida sonda, mas, apenas fazer o teste com o estetoscópio (ruídos hidroaéreos) e visualizar o borbulhar no copo com água*”,

considerou **viável (grifo nosso)** o enfermeiro introduzir a sonda nasogástrica no domicílio e iniciar a dieta após realizar os testes de ausculta e de aspiração gástrica, pois entenderam que tais testes permitem certificar-se do posicionamento da sonda nasogástrica. No entanto, destaca-se que, em documento datado de 2017, portanto posterior ao Parecer Técnico 09/2011 do Coren-DF, a Sociedade Americana de Nutrição Parenteral (*ASPEN-Safe Practices for Enteral Nutrition Therapy*), *não recomenda confiar apenas no método auscultatório para diferenciar entre a colocação gástrica e respiratória ou entre a colocação gástrica e do intestino delgado.*

Em se tratando da localização da sonda nasoenteral, o referido Parecer Técnico 09/2011 do Coren-DF apresenta o entendimento de que o único meio de se certificar quanto ao seu correto posicionamento é por meio *“da realização do exame de RX de abdome, para visualizar a localização da ponta radiopaca desta sonda, para então iniciar ou não a dieta com segurança para o cliente”.*

Potter, Perry e Elkin (2013), ao descreverem a técnica de inserção e remoção de uma sonda de alimentação, oro/nasogástrica ou nasoenteral, alertam que a insuflação de ar na sonda durante a ausculta do abdome não é um meio confiável para diferenciar entre a inserção no estômago, no trato respiratório e no intestino delgado. Além disso, as autoras indicam que outros métodos podem e devem ser utilizados, como: avaliação das características do líquido aspirado, dado que a sua coloração pode diferenciar a localização gástrica da localização intestinal; medição do pH do líquido aspirado, utilizando-se de tiras indicadoras do pH, pois um valor de pH com valores de 0 a 4 é uma boa indicação da localização gástrica da sonda. Em edição de 2021 do *“Guia completo de procedimentos e competências de enfermagem”*, Potter e Perry (2021) reiteram o entendimento de que a insuflação de ar na sonda durante a ausculta do abdome não é um meio confiável para determinar a posição da ponta da sonda de alimentação

Diante do exposto, e em consonância com a Resolução COFEN nº 619/2019, entende-se que o procedimento de sondagem oro/nasoenteral, seja qual for sua finalidade, requer cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica, conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, assim como, ser executado no contexto do Processo de Enfermagem, atendendo-se às determinações da Resolução Cofen nº 358, de 15 de outubro

de 2009, da Resolução Cofen nº 429, de 30 de maio de 2012 e aos princípios da Política Nacional de Segurança do Paciente, do Sistema Único de Saúde.

3. CONCLUSÃO

Diante do apresentado, conclui-se que, em se tratando de sondas nasoentéricas, a visualização radiográfica é a medida mais consistente para determinar a colocação da sonda, sendo considerado padrão ouro para essa situação, inclusive em ambiente domiciliar, conforme preconizado na RDC nº 503 de 27 de maio de 2021 sobre a Terapia Nutricional Enteral (TNE) e os consensos internacionais. Além disso, conforme aponta a RDC nº 11 de 26 de janeiro de 2006, os serviços de atenção domiciliar devem dispor dos recursos necessários para assegurar o suporte técnico e a capacitação dos profissionais envolvidos na assistência ao paciente em ambiente domiciliar.

No que tange aos pacientes em atendimento domiciliar que apresentam dificuldade de transporte para realização de radiografias, sugere-se a utilização de equipamentos de ultrassonografia a beira do leito do tipo Point Of Care Ultrasound - POCUS, no intuito de melhorar a eficácia dos procedimentos, diminuir as complicações e limitar a dor e o sofrimento de tais pacientes. Destaca-se que tais equipamentos são utilizados no âmbito de Unidades de Terapia Intensiva e em situações de atendimento de emergência em diversos serviços de assistência à saúde no Brasil, sendo os profissionais capacitados para manuseio e realização de exame.

Quanto à sondagem nasogástrica, seja ela introduzida em domicílio ou não, a literatura investigada aponta como recomendação da certificação do seu posicionamento o teste de aspiração gástrica, para avaliação das características do líquido aspirado e a medição do pH, como medidas menos propensas a erros de avaliação. Tanto a sondagem nasogástrica quanto a nasoentérica demandam conhecimento teórico e prático específico, de complexidade mais elevada e, portanto, conforme preconizado pela Lei do Exercício Profissional, deverão ser realizadas pelo profissional Enfermeiro.

Reitera-se ainda que, no exercício de suas atividades, o profissional deve aplicar o Processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade, conforme preconizado pela Resolução Cofen nº 358/2009. Sugere-se ainda como mecanismo de orientação e segurança a cons-

trução de protocolos institucionais que abordem o tema, bem como sirvam de fonte de consulta para a prática assistencial.

É o parecer.

Brasília, 30 de julho de 2021.
COREN-DF.

Câmara Técnica de Assistência ao COREN-DF

Relator: Teresa Christine Pereira Morais
COREN-DF 65.064-ENF

Revisor: Rinaldo de Souza Neves
COREN-DF 54.747-ENF

Aprovado no dia 14 de julho na Reunião da Câmara Técnica de Assistência ao COREN-DF.

Homologado em 30 de julho de 2021 na 543ª Reunião Ordinária de Plenária (ROP) dos
Conselheiros do COREN-DF

REFERÊNCIAS

BOULLATA, Joseph et al. ASPEN safe practices for enteral nutrition therapy. *J Parenter Enteral Nutr*, 41 (2017), pp. 15-103.

BRANDT, L.J., At the focal point – Commentary, *Gastrointestinal Endoscopy*, v. 72, n.5, USA, 2010.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 503, de 27 de maio de 2021. Dispõe sobre os requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Enteral.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 11, de 26 de janeiro de 2006. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção Domiciliar.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução nº 0564, de 2017. Aprova a

reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Disponível em http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html.

BRASIL. Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, e dá outras providências. Disponível em <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D94406.htm>.

BRASIL. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências. Disponível em <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7498.htm>.

BRASIL. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986: Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Disponível em: <http://www.abennacional.org.br/download/LeiPROFISSIONAL.pdf> [acesso 21 abril 2021].

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (BRASIL). Resolução nº 619/2019, de 22 de novembro de 2019. Normatiza a atuação da Equipe de Enfermagem na Sondagem Oro/nasogástrica e Nasoentérica [resolução na internet]. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofenno-567-2018_60340.html.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. COFEN. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 2007.

POTTER, Patricia A; PERRY, Anne G. Guia completo de procedimentos e competências de enfermagem. Ed 9ª. Rio de Janeiro: GEN, Guanabara Koogan Ltda, 2021.

POTTER, Patricia A; PERRY, Anne G; ELKIN, Martha K. Procedimentos e intervenções de enfermagem. Ed. 5ª. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SILVA, Amanda Stefani Torquato da; PINTO, Regiane Lima Gasques; ROCHA, Leandro Rodrigues da. Prevenção de eventos adversos relacionados à sonda nasogástrica e nasoenteral: uma revisão integrativa. J. nurs. health. 2020;10(n.esp.):e20104003

ZATELLI, Marianna; VEZZALI, Norberto. 4-Point ultrasonography to confirm the correct position of the nasogastric tube in 114 critically ill patients. J Ultrasound. 2016 Oct 28;20(1):53-58. doi: 10.1007/s40477-016-0219-0. PMID: 28298944; PMCID: PMC5334265.